



ENABON

SPOT ON / SOLUCIÓN TÓPICA
Fipronil 10% y S-metopreno 12%
Antiparasitario externo pulgüicida para gatos

- Formulado a base de dos ingredientes activos altamente eficaces.
- Efectiva contra adultos, larvas y huevos de pulgas
- Control desde las 24 horas post aplicación.

Composición

Cada pipeta de 0,5 mL contiene:

Fipronil.....	50 mg
(S)-Metopreno.....	60 mg
Excipientes c.s.p.....	0,5 mL

Forma farmacéutica

SPOT ON

Especie de destino

Gatos hasta 10 Kg.

Dosis

0,5 mL/ gato, equivalentes a 5 mg de fipronil y 6 mg de metopreno/kg de peso vivo, cada 30 días.

Modo de empleo



1. Cortar la punta superior de la pipeta.



2. Colocar el producto directamente sobre la piel, abriendo el pelaje en 2 o 3 puntos entre los hombros.

Efectos adversos y reacciones adversas

Luego de la aplicación, podría ocurrir eventualmente irritación de la piel y/o pérdida de pelo (alopecia) con o sin presencia de prurito y eritema en o alrededor del sitio de aplicación. Esta sinología es de carácter transitorio y debiese remitir con el transcurso de los días. En caso de aparecer alguna reacción de hipersensibilidad en la piel, se sugiere lavar la zona de aplicación con agua. En casos raros, es posible evidenciar aumento de la salivación producto de lamidos en la zona de aplicación, así como también, inapetencia, vómitos, letargia y temblores. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

Interacciones

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

Hasta 10 kg





Hasta 10 kg



Advertencias y Precauciones especiales de uso:

Se recomienda aplicar el medicamento en una zona del cuerpo donde no exista posibilidad de lamido. Adicionalmente, se debe evitar que los animales se laman unos a otros.

El producto demora aproximadamente 24 horas en extenderse completamente por toda la piel, por lo tanto, no es aconsejable bañar a los animales, ni 48 horas antes, ni 48 horas posterior a su aplicación.

Aplicar única y exclusivamente vía tópica en gatos.

Para un control óptimo de las pulgas, se deben tratar también simultáneamente las camas y otros sitios comúnmente frecuentados por los animales para así prevenir nuevas infestaciones después del tratamiento. Además de tratar a otras mascotas con los productos adecuados según su especie.

Contraindicaciones

No administrar en animales con hipersensibilidad descrita a alguno de los principios activos. No administrar en gatos menores de 2 meses de edad y/o que pesen menos de 1 Kg. No administrar en animales enfermos o convalecientes. No aplicar el producto en heridas o lesiones en la piel. No administrar en conejos, ya que podrían ocurrir reacciones adversas graves, incluyendo la muerte. No utilizar en otras especies.

Precauciones para la persona que aplica el producto

Este producto puede causar irritación en las mucosas, piel y ojos. Para su manipulación y aplicación se aconseja seguir medidas generales de higiene, mediante el uso de guantes para su administración, evitando el contacto con manos y eliminar el material usado (pipetas vacías). Lavar las manos, posterior a su aplicación.

Personas con hipersensibilidad conocida a los principios activos, deben evitar el contacto con el producto.

En caso de contacto del medicamento con los ojos o piel, se aconseja lavar con abundante agua. Si ocurre irritación, acudir a un centro asistencial, llevando el inserto para mostrar al personal médico.

En caso de ingestión accidental se aconseja asistir a un centro médico y mostrar el inserto del producto.

No manipular la zona de aplicación de la mascota, hasta que el pelo esté seco. No fumar, comer ni beber durante la administración del producto.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente, a menos de 30°C, protegido de la luz solar directa y en su envase original. No refrigerar ni congelar. Una vez abierta la pipeta, utilizar inmediatamente.

Vida útil

24 meses

Registro SAG: 7918/2024

Presentación: 1 pipeta de 0,5 mL. Caja de 10 unidades por empaque

